Métodos Numéricos

Sistemas Lineares – Métodos Diretos

Professor Volmir Eugênio Wilhelm

Professora Mariana Kleina

Agnelo Denis Vieira

Resolução de Sistemas Lineares

- Método de Cramer
- Eliminação de Gauss
- Decomposição LU
- Decomposição Cholesky

Resolução de Sistemas Lineares

Partição da matriz

Resolução de Sistemas Lineares

Teorema 2.2.3

Seja A uma matriz $n \times n$.

- (a) Se B é a matriz que resulta quando uma única linha ou uma única coluna de A é multiplicada por um escalar k , então $\det(B) = k \det(A)$.*
- (b) Se B é a matriz que resulta quando duas linhas ou duas colunas de A são permutadas, então $\det(B) = -\det(A)$.*
- (c) Se B é a matriz que resulta quando um múltiplo de uma linha de A é somado a uma outra linha ou quando um múltiplo de uma coluna de A é somado a uma outra coluna, então $\det(B) = \det(A)$.*

Resolução de Sistemas Lineares

Teorema 2.2.2

Se A é uma matriz triangular (triangular superior, triangular inferior ou diagonal) de tamanho $n \times n$, então $\det(A)$ é o produto das entradas na diagonal principal da matriz; ou seja, $\det(A) = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

Teorema 2.2.5

Se A é uma matriz quadrada com duas linhas proporcionais ou duas colunas proporcionais, então $\det(A) = 0$.

Resolução de Sistemas Lineares

Método de Cramer

Resolução de Sistemas Lineares

Teorema 2.4.3

Regra de Cramer

Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ é um sistema de n equações lineares em n incógnitas tal que $\det(A) \neq 0$, então o sistema tem uma única solução. Esta solução é

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

onde A_j é a matriz obtida substituindo as entradas da j -ésima coluna de A pelas entradas da matriz

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Resolução de Sistemas Lineares

Para resolver um sistema de n equações lineares em n incógnitas pela regra de Cramer, é necessário calcular $(n+1)$ determinantes de matrizes de dimensão $(n \times n)$.

Para sistemas com mais de três equações, a eliminação gaussiana é muito mais eficiente pois somente requer a redução de uma matriz aumentada $(n \times (n+1))$.

Calcular o determinante de uma matriz $(n \times n)$ pela definição envolve a realização de $n!$ operações. Aplicando o método da redução Gaussiana o número de operações é proporcional a n^3 .

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Motivação

Qual sistema é mais fácil resolver?

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n = d_1 \\ \quad c_{22}x_2 + \dots + c_{2n}x_n = d_2 \\ \dots \\ \quad \quad \quad c_{mn}x_n = d_m \end{cases}$$

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Introdução

Consiste em **transformar** o sistema a ser resolvido em um sistema triangular equivalente, por meio de operações elementares. A solução é então obtida, resolvendo-se um sistema triangular - resolução de forma retroativa.

Operações Elementares - Transformação do Sistema Linear:

- Trocar duas equações (linhas);
- Trocar duas variáveis (colunas);
- Multiplicar uma equação (linha) por uma constante não nula;
- Adicionar um múltiplo de uma equação (linha) a uma outra equação (linha).

Operações elementares garantem que o sistema obtido é equivalente ao original.

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Transformação em matriz triangular superior

Construção da matriz aumentada [A b]

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)}x_1 + a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)} \\ \dots \\ a_{n1}^{(1)}x_1 + a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)} \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array} \right]$$

$a_{lin\ col}^{(k)}$ elemento da matriz A na etapa de transformação "k" na linha "lin" e coluna "col"

$b_{lin}^{(k)}$ elemento da matriz b na etapa de transformação "k" na linha "lin"

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Transformação em matriz triangular superior

Pivoteamento

pivô →

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array} \right]$$

Zerar coeficientes
de x_1 usando
**operações
elementares**

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & \cdots & a_{1n}^{(2)} & b_1^{(2)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array} \right]$$

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Transformação em matriz triangular superior

Pivoteamento

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & \cdots & a_{1n}^{(2)} & b_1^{(2)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array} \right]$$

pivô

Zerar coeficientes
de x_2 usando
operações
elementares

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(3)} & a_{12}^{(3)} & \cdots & a_{1n}^{(3)} & b_1^{(3)} \\ 0 & a_{22}^{(3)} & \cdots & a_{2n}^{(3)} & b_2^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(3)} & b_n^{(3)} \end{array} \right]$$

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Resolução retroativa

Após a transformação do sistema a ser resolvido em um sistema triangular, resolve-se o sistema linear triangular de forma retroativa.

Suponha que após k iterações, alcançou-se a matriz triangular superior. Então a solução de forma retroativa do sistema triangular é dada pela fórmula.

$$x_i = \frac{b_i^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(k)} x_j}{a_{ii}^{(k)}}, \quad \forall i = n, \dots, 1$$

Da n -ésima equação calcule o valor de x_n ; substitua este valor na equação de ordem $(n - 1)$ e calcule o valor de x_{n-1} ; substitua os dois valores na equação de ordem $(n - 2)$ e obtenha o valor de x_{n-2} , ... , até chegar na primeira equação onde substituirá os valores de $x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_4, x_3$ e x_2 previamente calculados para obter o valor de x_1 .

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Resolução retroativa

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}^{(k)}x_1 = b_1^{(k)} - a_{12}^{(k)}x_3 - \dots - a_{1(n-1)}^{(k)}x_{(n-1)} - a_{1n}^{(k)}x_n \\ a_{22}^{(k)}x_2 = b_2^{(k)} - a_{23}^{(k)}x_3 - \dots - a_{2(n-1)}^{(k)}x_{(n-1)} - a_{2n}^{(k)}x_n \\ \dots \\ a_{(n-1)(n-1)}^{(k)}x_{(n-1)} = b_{(n-1)}^{(k)} - a_{(n-1)n}^{(k)}x_n \\ a_{nn}^{(k)}x_n = b_n^{(k)} \end{array} \right.$$

R e t r o a t i v a

Último

Penúltimo

...

2º

1º

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{1}{a_{11}^{(k)}} (b_1^{(k)} - a_{12}^{(k)}x_3 - \dots - a_{1(n-1)}^{(k)}x_{(n-1)} - a_{1n}^{(k)}x_n) \\ x_2 = \frac{1}{a_{22}^{(k)}} (b_2^{(k)} - a_{23}^{(k)}x_3 - \dots - a_{2(n-1)}^{(k)}x_{(n-1)} - a_{2n}^{(k)}x_n) \\ \dots \\ x_{(n-1)} = \frac{1}{a_{(n-1)(n-1)}^{(k)}} (b_{(n-1)}^{(k)} - a_{(n-1)n}^{(k)}x_n) \\ x_n = \frac{1}{a_{nn}^{(k)}} (b_n^{(k)}) \end{array} \right.$$

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Transformação em matriz triangular superior

Supor que o elemento que está na posição a_{kk} é diferente de zero no início da etapa k .

$$\text{Eliminação} \left[\begin{array}{l} \text{Para } k = 1, \dots, n-1 \\ \left[\begin{array}{l} \text{Para } i = k + 1, \dots, n \\ m = \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \\ a_{ik} = 0 \\ \text{Para } j = k + 1, \dots, n \\ a_{ij} = a_{ij} - ma_{kj} \\ b_i = b_i - mb_k \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\text{Resolução do sistema:} \left[\begin{array}{l} x_n = b_n / a_{nn} \\ \text{Para } k = (n - 1), \dots, 2, 1 \\ \left[\begin{array}{l} s = 0 \\ \text{Para } j = (k + 1), \dots, n \\ [s = s + a_{kj} x_j \\ x_k = (b_k - s) / a_{kk} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Transformação em matriz triangular superior

```
% implementação essencial do método da Eliminação Gaussiana
% triangularização da matriz A
clear
clc

A = [25, 5, 1; 64, 8, 1; 144,12,1]
b = [106.8; 177.2; 279.2]

[lin,col] = size(A);
n = lin;
for col=1:(n-1)
    pivo = A(col,col);
    for lin=(col+1):n
        m(col) = A(lin,col)/A(col,col);
        for j=col:n
            A(lin,j) = A(lin,j)-m(col)*A(col,j)
        end
        b(lin) = b(lin)-m(col)*b(col)
    end
end
end
```

% determina o no. de linhas e colunas da matr linz A
% atribui à variável n o no. de linhas da matriz
% percorre a matriz A da coluna 1 até a coluna (n-1)
% identifica pivô da coluna
% percorre as linhas da coluna em análise,
% da linha (col+1) até a linha n
% determina o multiplicador da coluna
% determina o novo valor de cada elemento
% na linha em análise na matriz A
% determina o novo valor do elemento
% na linha em análise no vetor b

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Determinação das incógnitas

```
% determinação das incógnatas pela substituição reversa
x(n,1) == b(n,1)/A(n,n)
for lin=(n-1):-1:1
    soma == 0
    for col = (lin+1):n
        soma = soma + A(lin,col)*x(col,1);
    end
    x(lin,1) == (b(lin,1)-soma)/A(lin,lin)
end

% determinação do resíduo e da norma do resíduo
R == A*x - b
normaR == norm(R)
```

Resolução de Sistemas Lineares

Sistema Linear – Exemplo - Aplicar manualmente o método da Eliminação de Gauss para resolver o sistema abaixo

Suponha que a velocidade de subida de um foguete em 3 momentos diferentes é dada por:

Tempo (s)	Velocidade (m/s)
5	106,8
8	177,2
12	279,2

Em qualquer instante de tempo, a velocidade é aproximadamente $v(t)=at^2+bt+c$. Determinar os valores de a, b e c.

Pode-se configurar as equações na forma de um sistema de equações lineares para encontrar a, b e c.

$$v(5) = a(5^2) + b(5) + c = 25a + 5b + c = 106,8$$

$$v(8) = a(8^2) + b(8) + c = 64a + 8b + c = 177,2$$

$$v(12) = a(12^2) + b(12) + c = 144a + 12b + c = 279,2$$

continua...

Resolução de Sistemas Lineares

Sistema Linear – Exemplo

...continuação

$$\begin{cases} 25a+5b+c=106,8 \\ 64a+8b+c=177,2 \\ 144a+12b+c=279,2 \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 64 & 8 & 1 \\ 144 & 12 & 1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 106,8 \\ 177,2 \\ 279,2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.290472 \\ 19.6905 \\ 1.08571 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} v(t) &= at^2 + bt + c \\ &= 0.290472t^2 + 19.6905t + 1.08571, \quad 5 \leq t \leq 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v(6) &= 0.290472(6)^2 + 19.6905(6) + 1.08571 \\ &= 129.686 \text{ m/s.} \end{aligned}$$

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Transformação em matriz triangular superior

Estratégias práticas de pivoteamento.

O que acontece se o pivô for nulo?

- Pivô próximo de zero pode levar a resultados totalmente imprecisos.
- Para contornar este problema deve-se adotar uma estratégia para a escolha de um “bom” pivô.

Pivoteamento parcial

Escolher para pivô o elemento de maior módulo na coluna, dentre os que ainda irão atuar no processo de eliminação.

Requer alteração de linhas

Pivoteamento completo

Escolher para pivô o elemento de maior módulo (nas linhas e colunas) dentre todos os elementos que ainda irão atuar no processo de eliminação.

Requer alteração de linhas e colunas

Resolução de Sistemas Lineares

Eliminação de Gauss – Número de Operações

Seja um sistema de equações lineares $Ax = b$, com $A_{n \times n}$.

O número de operações para resolver o sistema via método de eliminação de Gauss é aproximadamente igual a

$$\frac{n^3}{3}$$

Por exemplo, se a matriz A possui dimensões 500×500 , o total de operações para resolver o sistema $Ax = b$ é aproximadamente

$$\frac{(500)^3}{3} = 4,2 \times 10^7 \quad (42 \text{ milhões})$$