

Lista 3

☆ Integrais múltiplas

1. Calcule as seguintes integrais duplas:

(a) $\int \int_R (2y^2 - 3xy^3) dx dy$, onde $R = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3\}$.

(b) $\int \int_R x \operatorname{sen} y dx dy$, onde $R = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{6}\}$.

(c) $\int \int_R \frac{1}{x+y} dx dy$, onde $R = [1, 2] \times [0, 1]$.

2. Determine o volume do sólido limitado pela superfície $z = x\sqrt{x^2 + y}$ e os planos $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$ e $z = 0$.

3. Determine o volume do sólido contido no primeiro octante limitado pelo cilindro $z = 9 - y^2$ e pelo plano $x = 2$.

4. Calcule as integrais iteradas $\int_0^1 \int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3} dy dx$ e $\int_0^1 \int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3} dx dy$. As respostas contradizem o Teorema de Fubini? Explique.

5. Calcule as seguintes integrais duplas:

(a) $\int \int_D xy dx dy$, onde $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$.

(b) $\int \int_D (x^2 - 2xy) dx dy$, onde $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2 - x\}$.

(c) $\int \int_D e^{x/y} dx dy$, onde $D = \{(x, y) : 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^3\}$.

(d) $\int \int_D x \cos y dx dy$, onde D é a região limitada por $y = 0$, $y = x^2$, $x = 1$.

(e) $\int \int_D 4y^3 dx dy$, onde D é a região limitada por $y = x - 6$ e $y^2 = x$.

(f) $\int \int_D xy dx dy$, onde D é a região do primeiro quadrante limitada pela circunferência de centro $(0, 0)$ e raio 1.

(g) $\int \int_D (x^2 \operatorname{tg} x + y^3 + 4) dx dy$, onde $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2\}$.

6. Determine o volume do sólido S em cada um dos seguintes casos:

(a) S é limitado superiormente pelo parabolóide $z = x^2 + y^2$ e sua projeção no plano xy é a região limitada por $y = x^2$ e $x = y^2$.

(b) S é limitado superiormente por $z = xy$ e sua projeção no plano xy é o triângulo de vértices $(1, 1)$, $(4, 1)$ e $(1, 2)$.

(c) S é a região do primeiro octante limitada pelo cilindro $x^2 + z^2 = 9$ e pelos planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e $x + 2y = 2$.

(d) S é limitado pelos planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ e $x + y + z = 1$.

(e) S é a região do primeiro octante limitada pelo cilindro $x^2 + y^2 = 1$ e pelos planos $y = z$, $x = 0$ e $z = 0$.

(f) S é limitado pelos cilindros $x^2 + y^2 = r^2$ e $y^2 + z^2 = r^2$.

7. Escreva as duas integrais iteradas correspondentes à integral dupla

$$\iint_D f(x, y) dx dy,$$

onde D é a região do plano limitada pelas curvas $y = -x^2 + x + 2$ e $x - 2y + 1 = 0$.

8. Calcule as seguintes integrais, invertendo a ordem de integração:

(a) $\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$ (b) $\int_0^3 \int_{y^2}^9 y \cos(x^2) dx dy$

(c) $\int_0^1 \int_{\arcsin y}^{\pi/2} \cos x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx dy$.

9. Calcule as integrais:

(a) $\int \int_R x dx dy$, onde R é o disco de centro na origem e raio 5.

(b) $\int \int_R xy dx dy$, onde R é a região do primeiro quadrante limitada pelas circunferências $x^2 + y^2 = 4$ e $x^2 + y^2 = 25$.

(c) $\int \int_R \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, onde R é a região interior à cardioide $r = 1 + \sin \theta$ e exterior à circunferência $r = 1$.

(d) $\int \int_D (x^2 + y^2) dx dy$, onde D é a região limitada pelas espirais $r = \theta$ e $r = 2\theta$, com $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

10. Determine o volume da região interior à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ e exterior ao cilindro $x^2 + y^2 = 2ax$, com $a > 0$.

11. Determine a massa e o centro de massa da lâmina que ocupa a região D e tem densidade ρ , nos seguintes casos:

(a) $D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ e $\rho(x, y) = x^2$.

(b) D é o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$, $(0, 3)$ e $\rho(x, y) = x + y$.

(c) D é a região do primeiro quadrante limitada pela parábola $y = x^2$ e a reta $y = 1$ e $\rho(x, y) = xy$.

(d) D é a região limitada pela parábola $y^2 = x$ e a reta $y = x - 2$ e $\rho(x, y) = 3$.

(e) $D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi\}$ e $\rho(x, y) = y$.

12. Calcule as integrais triplas:

(a) $\int \int \int_D yz dx dy dz$, onde $D = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 2z, 0 \leq x \leq z + 2\}$.

(b) $\int \int \int_D y dx dy dz$, onde D é a região abaixo do plano $z = x + 2y$ e acima da região no plano xy limitada pelas curvas $y = x^2$, $y = 0$ e $x = 1$.

(c) $\int \int \int_D xy dx dy dz$, onde D é o tetraedro sólido com vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ e $(0, 0, 3)$.

(d) $\int \int \int_D z dx dy dz$, onde D é limitada pelos planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $y + z = 1$ e $x + z = 1$.

(e) $\int \int \int_D x dx dy dz$, onde D é limitada pelo parabolóide $x = 4y^2 + 4z^2$ e pelo plano $x = 4$.

13. Determine a massa e o centro de massa do cubo $Q = [0, a] \times [0, a] \times [0, a]$ cuja densidade é dada pela função $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

14. Calcule as seguintes integrais:

(a) $\int \int \int_E (x^2 + y^2) dx dy dz$, onde E é a região limitada pelo cilindro $x^2 + y^2 = 4$ e pelos planos $z = -1$ e $z = 2$.

(b) $\int \int \int_E y dx dy dz$, onde E é a região entre os cilindros $x^2 + y^2 = 4$ e $x^2 + y^2 = 1$, limitada pelo plano xy e pelo plano $z = x + 2$.

(c) $\int \int \int_E x^2 dx dy dz$, onde E é o sólido limitado pelo cilindro $x^2 + y^2 = 1$, acima do plano $z = 0$ e abaixo do cone $z^2 = 4x^2 + 4y^2$.

15. Determine o volume da região R limitada pelos parabolóides $z = x^2 + y^2$ e $z = 36 - 3x^2 - 3y^2$.

16. Determine a massa e o centro de massa do sólido S limitado pelo parabolóide $z = 4x^2 + 4y^2$ e pelo plano $z = a$ ($a > 0$), se S tem densidade constante K .

17. Calcule as integrais:

(a) $\int \int \int_B (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, onde B é a bola unitária $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

(b) $\int \int \int_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, onde E é a região interior ao cone $\varphi = \pi/6$ e à esfera $\rho = 2$.

(c) $\int \int \int_E x dx dy dz$, onde E é o conjunto $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 \leq 1$, $x \geq 0$.

18. Determine a massa de um hemisfério sólido H de raio a se a densidade em qualquer ponto é proporcional a sua distância ao centro da base.

19. a) Calcule o volume da região limitada pelo elipsóide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

b) Calcule a massa do sólido $\xi = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2, z \geq a > 0\}$, $\delta(x, y, z) = z$.

20. Seja f contínua em $[0, 1]$ e seja R a região triangular com vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(0, 1)$. Mostre que

$$\int \int_R f(x+y) dx dy = \int_0^1 u f(u) du.$$

21. Calcule $\int \int_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^{n/2}} dx dy$, onde D é a região entre os círculos com centros na origem e raios r e R , $0 < r < R$. Para que valores de n a integral tem limite quando $r \rightarrow 0+$? E quando $R \rightarrow \infty$?

22. Faça uma análise semelhante para a integral tripla

$$\int \int \int_D \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{n/2}} dx dy dz,$$

onde D é a região interior às esferas com centros na origem e raios r e R , $0 < r < R$.

23. Use a transformação $x = u^2$, $y = v^2$, $z = w^2$ para calcular o volume da região limitada pela superfície $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$ e pelos planos coordenados.

☆ Integrais de linha

24. Calcule as seguintes integrais de linha ao longo da curva indicada:

(a) $\int_{\gamma} x ds$, $\gamma(t) = (t^3, t)$, $0 \leq t \leq 1$.

- (b) $\int_{\gamma} xy^4 ds$, γ é a semi-circunferência $x^2 + y^2 = 16$, $x \geq 0$.
- (c) $\int_{\gamma} (x - 2y^2) dy$, γ é o arco da parábola $y = x^2$ de $(-2, 4)$ a $(1, 1)$.
- (d) $\int_{\gamma} xy dx + (x - y) dy$, γ consiste dos segmentos de reta de $(0, 0)$ a $(2, 0)$ e de $(2, 0)$ a $(3, 2)$.
- (e) $\int_{\gamma} xyz ds$, $\gamma: x = 2t, y = 3 \sin t, z = 3 \cos t, 0 \leq t \leq \pi/2$.
- (f) $\int_{\gamma} xy^2 z ds$, γ é o segmento de reta de $(1, 0, 1)$ a $(0, 3, 6)$.
- (g) $\int_{\gamma} x^3 y^2 z dz$, γ é dada por $x = 2t, y = t^2, z = t^2, 0 \leq t \leq 1$.
- (h) $\int_{\gamma} z^2 dx - z dy + 2y dz$, γ consiste dos segmentos de reta de $(0, 0, 0)$ a $(0, 1, 1)$, de $(0, 1, 1)$ a $(1, 2, 3)$ e de $(1, 2, 3)$ a $(1, 2, 4)$.

25. Calcule $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$, onde $\vec{F}(x, y, z) = (x^2 + y)\vec{i} - 7yz\vec{j} + 2xz^2\vec{k}$ e γ é a curva ligando o ponto $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$ nos seguintes casos:

- (a) $\gamma(t) = (t, t^2, t^3)$;
- (b) γ é composta dos segmentos de reta de $(0, 0, 0)$ a $(1, 0, 0)$, depois a $(1, 1, 0)$ e depois a $(1, 1, 1)$;

26. Calcule $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para:

- (a) $\vec{F}(x, y) = y\vec{i} + (x^2 + y^2)\vec{j}$, onde γ é o arco de circunferência $\gamma(x) = (x, \sqrt{4 - x^2})$, ligando $(-2, 0)$ a $(2, 0)$;
- (b) $\vec{F}(x, y) = 2(x + y)\vec{i} + (x - y)\vec{j}$, onde γ é a elipse de equação $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, percorrida uma vez em sentido anti-horário.

27. Calcule:

- (a) $\int_{\gamma} x dx + (y + x) dy + z dz$, sendo γ a intersecção das superfícies $z = x^2 + y^2$ e $z = 2x + 2y - 1$, orientada de modo que sua projeção no plano Oxy seja percorrida uma vez no sentido horário;
- (b) $\int_{\gamma} (2y + 1) dx + z dy + x dz$, sendo γ a intersecção das superfícies $x^2 + 4y^2 = 1$ e $x^2 + z^2 = 1$, com $y \geq 0, z \geq 0$, percorrida uma vez do ponto $(1, 0, 0)$ ao ponto $(-1, 0, 0)$;
- (c) $\int_{\gamma} y dx + z dy + x dz$, sendo γ a intersecção das superfícies $x + y = 2$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y)$, orientada de modo que sua projeção no plano Oxz seja percorrida uma vez no sentido horário;
- (d) $\int_{\gamma} y dx + z dy + x dz$, sendo γ a intersecção das superfícies $z = xy$ e $x^2 + y^2 = 1$, orientada de modo que sua projeção no plano Oxy seja percorrida uma vez no sentido horário;
- (e) $\int_{\gamma} x^2 dx + x dy + z dz$, sendo γ a intersecção das superfícies $z = \frac{x^2}{9}$ e $z = 1 - \frac{y^2}{4}$, orientada de modo que sua projeção no plano Oxy seja percorrida uma vez no sentido anti-horário;
- (f) $\int_{\gamma} y^2 dx + 3z dy$, sendo γ a intersecção das superfícies $z = x^2 + y^2$ e $z = 2x + 4y$, orientada de modo que sua projeção no plano Oxy seja percorrida uma vez no sentido anti-horário;
- (g) $\int_{\gamma} z dy - x dz$, sendo γ a intersecção do elipsóide $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{6} = \frac{4}{3}$ com o plano $x + z = 2$, orientada de modo que sua projeção no plano Oxy seja percorrida uma vez no sentido anti-horário.

28. Calcule:

- (a) $\int_{\gamma} 2x dx + (z^2 - y^2) dz$, onde γ é o arco circular dado por $x = 0$, $y^2 + z^2 = 4$, de $(0, 2, 0)$ a $(0, 0, 2)$ $y \geq 0$;
- (b) $\int_{\gamma} \frac{(x+y) dx - (x-y) dy}{x^2 + y^2}$, onde γ é a circunferência $x^2 + y^2 = a^2$, percorrida uma vez no sentido horário;
- (c) $\int_{\gamma} \sqrt{y} dx + \sqrt{x} dy$, sendo γ a fronteira da região limitada por $x = 0$, $y = 1$ e $y = x^2$, percorrida uma vez no sentido horário;

29. Um cabo delgado é dobrado na forma de um semi-círculo $x^2 + y^2 = 4$, $x \geq 0$. Se a densidade linear é x^2 , determine a massa e o centro de massa do cabo.

30. Determine o trabalho realizado pelo campo de forças $\vec{F}(x, y) = x\vec{i} + (y + 2)\vec{j}$ ao mover um ponto ao longo da cicloide $\vec{r}(t) = (t - \sin t)\vec{i} + (1 - \cos t)\vec{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

31. Usando o Teorema de Green, calcule as seguintes integrais de linha:

- (a) $\oint_{\gamma} x^2 y dx + xy^3 dy$, onde γ é o quadrado com vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ e $(0, 1)$, orientado positivamente;
- (b) $\oint_{\gamma} (x + 2y) dx + (x - 2y) dy$, onde γ consiste do arco da parábola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ e do segmento de reta de $(1, 1)$ a $(0, 0)$.
- (c) $\oint_{\gamma} (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos y^2) dy$, onde γ é a fronteira da região limitada pelas parábolas $y = x^2$ e $x = y^2$ percorrida no sentido anti-horário.
- (d) $\oint_{\gamma} x^2 dx + y^2 dy$, γ é a curva $x^6 + y^6 = 1$, sentido anti-horário.
- (e) $\oint_{\gamma} xy dx + (2x^2 + x) dy$, γ consiste do segmento de reta unindo $(-2, 0)$ a $(2, 0)$ e da semi-circunferência $x^2 + y^2 = 4$, $y \geq 0$, orientada positivamente.
- (f) $\oint_{\gamma} 2xy dx + (x^2 + x) dy$, γ é a cardióide $\rho = 1 + \cos \theta$ orientada positivamente.
- (g) $\oint_{\gamma} (xy + e^{x^2}) dx + (x^2 - \ln(1 + y)) dy$, γ consiste do segmento de reta de $(0, 0)$ a $(\pi, 0)$ e do arco da curva $y = \sin x$, orientada positivamente.
- (h) $\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$, onde $\vec{F}(x, y) = (y^2 - x^2 y)\vec{i} + xy^2\vec{j}$ e γ consiste do arco de circunferência $x^2 + y^2 = 4$ de $(2, 0)$ a $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, e dos segmentos de reta de $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ a $(0, 0)$ e de $(0, 0)$ a $(2, 0)$.

32. Seja D uma região de \mathbb{R}^2 com D e ∂D satisfazendo as hipóteses do Teorema de Green. Mostre que a área de D coincide com a integral $\int_{\partial D} x dy = \int_{\partial D} -y dx$.

33. Usando o exercício anterior, calcule a área de:

- (a) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$;
- (b) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^{2/3} + y^{2/3} \leq a^{2/3}\}$.

34. Determine a área da região limitada pela hipocicloide dada por $\vec{r}(t) = \cos^3 t \vec{i} + \sin^3 t \vec{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

35. Neste exercício, vamos calcular a área de um polígono irregular.

(a) Se γ é o segmento de reta ligando o ponto (x_1, y_1) ao ponto (x_2, y_2) , mostre que

$$\int_{\gamma} x dy - y dx = x_1 y_2 - x_2 y_1.$$

(b) Em ordem anti-horária, os vértices de um polígono são $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)$. Mostre que sua área é dada por

$$A = \frac{1}{2}[(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + \dots + (x_{N-1} y_N - x_N y_{N-1}) + (x_N y_1 - x_1 y_N)].$$

(c) Determine a área do pentágono de vértices $(0, 0), (2, 1), (1, 3), (0, 2)$ e $(-1, 2)$.

36. Calcule

(a) $\int_{\gamma} x^2(5y dx + 7x dy) + e^y dy$, sendo γ a elipse $16x^2 + 25y^2 = 100$, percorrida de $(0, -2)$ até $(0, 2)$, $x > 0$.

(b) $\int_{\gamma} (2xe^y - x^2 y - \frac{y^3}{3}) dx + (x^2 e^y + \text{sen} y) dy$, sendo γ a circunferência $x^2 + y^2 - 2x = 0$, percorrida de $(0, 0)$ até $(2, 0)$ com $y > 0$.

(c) $\int_{\gamma} \vec{v} dr$, sendo γ a fronteira do retângulo $[1, 2] \times [-1, 1]$ e $\vec{v}(x, y) = 2 \arctan \frac{y}{x} \vec{i} + [\ln(x^2 + y^2) + 2x] \vec{j}$, percorrida no sentido anti-horário.

37. Calcule

(a) $\int_{\gamma} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$ sendo γ a curva fronteira da região determinada pelas curvas $y^2 = 2(x + 2)$ e $x = 2$, orientada no sentido horário.

(b) $\int_{\gamma} \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$ sendo γ a curva $y = x^2 + 1$ $-1 \leq x \leq 2$, percorrida do ponto $(-1, 2)$ a $(2, 5)$.

(c) $\int_{\gamma} \frac{y dx - (x-1) dy}{(x-1)^2 + y^2}$ sendo γ a circunferência $x^2 + y^2 = 4$, percorrida no sentido horário.

(d) $\int_{\gamma} \frac{x^2 y dx - x^3 dy}{(x^2 + y^2)^2}$ sendo $\gamma = \partial R$ onde $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$, orientada no sentido horário.

38. Verifique que a integral $\int_{\gamma} 2x \text{sen} y dx + (x^2 \cos y - 3y^2) dy$, onde γ é uma curva ligando $(-1, 0)$ a $(5, 1)$, é independente do caminho e calcule o seu valor.

39. Seja γ uma curva plana simples, fechada e lisa por partes percorrida uma vez no sentido horário. Encontre todos os valores possíveis para

(a) $\int_{\gamma} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$

(b) $\int_{\gamma} \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + 9y^2}$

40. Sejam as curvas γ_1 a circunferência $x^2 + y^2 = \frac{1}{16}$ percorrida no sentido anti-horário, γ_2 a circunferência $x^2 + y^2 = 4$, percorrida no sentido anti-horário e γ_3 a curva formada pela união das três seguintes circunferências: $(x - 1)^2 + y^2 = \frac{1}{9}$, $(x + 1)^2 + y^2 = \frac{1}{9}$, ambas percorridas no sentido horário e $x^2 + y^2 = \frac{1}{9}$ percorrida no sentido anti-horário. Se $I_k = \int_{\gamma_k} P dx + Q dy$ onde $P(x, y) = -y \left[\frac{1}{(x-1)^2 + y^2} + \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{(x+1)^2 + y^2} \right]$ e $Q(x, y) = \frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2} + \frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2}$ então calcule I_1, I_2 e I_3 .

41. Calcule $\int_{\gamma} F d\vec{r}$ onde $F = \left(\frac{-y}{x^2 + \frac{y^2}{9}} + y, \frac{x}{x^2 + \frac{y^2}{9}} + 3x \right)$ se

- (a) γ é a curva $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$, percorrida uma vez no sentido horário.
 (b) γ é a curva $(x-1)^2 + y^2 = 4$, percorrida uma vez no sentido horário.

42. Um campo de vetores \vec{F} em \mathbb{R}^2 se diz *radial* (ou *central*) se existe uma função $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\vec{F}(x, y) = g(|\vec{r}|)\vec{r}$, onde $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Suponha que g é de classe C^1 . Mostre que \vec{F} é conservativo.

43. Determine todos os valores possíveis da integral

$$\int_{(1,0)}^{(2,2)} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$$

sobre um caminho que não passe pela origem.

44. Em cada caso abaixo, determine se \vec{F} é ou não campo gradiente no domínio indicado. Em caso afirmativo, determine o potencial de \vec{F} .

- (a) $\vec{F}(x, y) = x\vec{i} + x\vec{j}$ em \mathbb{R}^2
 (b) $\vec{F}(x, y) = (2xe^y + y)\vec{i} + (x^2e^y + x - 2y)\vec{j}$ em \mathbb{R}^2
 (c) $\vec{F}(x, y, z) = (2x^2 + 8xy^2)\vec{i} + (3x^3y - 3xy)\vec{j} + -(4z^2y^2 + 2x^3z)\vec{k}$ em \mathbb{R}^3
 (d) $\vec{F}(x, y, z) = (x+z)\vec{i} - (y+z)\vec{j} + (x-y)\vec{k}$ em \mathbb{R}^3
 (e) $\vec{F}(x, y, z) = (y^2 \cos x + z^3)\vec{i} - (4 + 2y \operatorname{sen} x)\vec{j} + (3xz^2 + 2)\vec{k}$ em \mathbb{R}^3
 (f) $\vec{F}(x, y) = \frac{-y\vec{i} + x\vec{j}}{x^2 + y^2}$, em $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$
 (g) $\vec{F}(x, y) = \frac{-y\vec{i} + x\vec{j}}{x^2 + y^2}$, em $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0 \text{ se } y = 0\}$
 (h) $\vec{F}(x, y) = \frac{x\vec{i} + y\vec{j}}{x^2 + y^2}$, em $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$

45. Seja o campo $\vec{F}(x, y) = \frac{x\vec{i} + y\vec{j}}{x^2 + y^2}$ e γ a curva dada por $\gamma(t) = (e^t, \operatorname{sen} t)$ para $0 \leq t \leq \pi$. Calcule $\int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r}$.

46. Calcule as integrais:

- (a) (a) $\int_{\gamma} 7x^6y dx + x^7 dy$ sendo $\gamma(t) = (t, e^{t^2-1})$, onde $t \in [0, 1]$.
 (b) (b) $\int_{\gamma} [\ln(x + y^2) - y] dx + [2y \ln(x + y^2) - x] dy$ sendo γ a curva $(x-2)^2 + y^2 = 1$ com $y \geq 0$ orientada no sentido horário.
 (c) (c) $\int_{\gamma} \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$ sendo γ a curva dada por $x(t) = \cos^3 t$ e $y(t) = \operatorname{sen}^3 t$ com $y \geq 0$ ligando os pontos $(1, 0)$ e $(0, 1)$, nessa ordem.

47. Mostre que as integrais abaixo independem do caminho e calcule-as.

- (a) (a) $\int_{(1,1)}^{(a,b)} 2xy dx + (x^2 - y^2) dy$.
 (b) (b) $\int_{(0,0)}^{(a,b)} \operatorname{sen} y dx + x \cos y dy$.

48. Calcule

(a) (a) $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz dx + xz dy + xy dz$.

(b) (b) $\int_{\gamma} \sin(yz) dx + xz \cos(yz) dy + xy \cos(yz) dz$, sendo $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$ para $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$.

49. Calcule $\int_A^B \frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$, onde o ponto A pertence à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ e o ponto B pertence a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

50. Se $\vec{n}(x, y)$ é vetor unitário normal ao traço da curva γ em (x, y) , calcule $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ sendo

(a) (a) $\vec{F}(x, y) = x^{10} \vec{i} + (3x - 10x^9 y) \vec{j}$ e γ a parte da circunferência $x^2 + y^2 = 1$ contida no primeiro quadrante, n normal exterior à circunferência

(b) (b) $\vec{F}(x, y) = x^3 y^3 \vec{i} - \frac{3x^2 y^4 + 2}{4} \vec{j}$ e $\gamma(t) = (t^3, \sin(4 \arctan t^2))$, $t \in [0, 1]$, $n \cdot \vec{j} \leq 0$.

☆ Respostas

(1) (a) $-\frac{585}{8}$, (b) $\frac{15}{4}(2 - \sqrt{3})$, (c) $\ln \frac{27}{16}$; (2) $\frac{4}{15}(2\sqrt{2} - 1)$; (3) 36; (4) $-1/2$ e $1/2$; (5) (a) $\frac{1}{12}$, (b) $-\frac{19}{42}$, (c) $\frac{1}{2}e^4 - 2e$, (d) $(1 - \cos 1)/2$, (e) $\frac{500}{3}$, (f) $\frac{1}{8}$, (g) 8π ; (6) (a) $\frac{6}{35}$, (b) $\frac{31}{8}$, (c) $\frac{1}{6}(11\sqrt{5} - 27) + \frac{9}{2} \arcsen \frac{2}{3}$, (d) $\frac{1}{6}$, (e) $\frac{1}{3}$, (f) $\frac{16}{3}r^3$; (8) (a) $(e^9 - 1)/6$, (b) $\frac{1}{4} \sin 81$, (c) $(2\sqrt{2} - 1)/3$; (9) (a) 0, (b) $\frac{609}{8}$, (c) 2, (d) $24\pi^5$; (11) (a) $\frac{2}{3}$, (b) $(0, \frac{1}{2})$, (c) $(\frac{3}{4}, \frac{3}{2})$, (d) $\frac{1}{6}$, (e) $(\frac{4}{7}, \frac{3}{4})$, (f) $\frac{27}{2}$, (g) $(\frac{8}{5}, \frac{1}{2})$, (h) $\frac{\pi}{4}$, (i) $(\frac{\pi}{2}, \frac{16}{9\pi})$; (12) (a) $\frac{7}{5}$, (b) $\frac{5}{28}$, (c) $\frac{1}{10}$, (d) $\frac{1}{12}$, (e) $\frac{16\pi}{3}$; (13) a^5 , $(7a/12, 7a/12, 7a/12)$; (14) (a) 24π , (b) 0, (c) $2\pi/5$; (15) 162π ; (16) $\pi K a^2/8$, $(0, 0, 2a/3)$; (17) (a) $4\pi/5$, (b) $4\pi(2 - \sqrt{3})$, (c) $\frac{3\pi}{2}$; (18) $K\pi a^4/2$, onde K é a constante de proporcionalidade; (19) (a) $\frac{4}{3}\pi abc$; (b) $\frac{\pi}{4}(r^2 - a^2)^2$;

(24) (a) $(10\sqrt{10} - 1)/54$, (b) 1638,4, (c) 48, (d) $\frac{17}{3}$, (e) $9\sqrt{13}\pi/4$, (f) $3\sqrt{35}$, (g) $\frac{16}{11}$, (h) $\frac{77}{6}$; (25) (a) $-\frac{11}{15}$, (b) 1; (26) (a) 2π , (b) πab ; (27) (a) $-\pi$, (b) -2 , (c) $-2\pi\sqrt{2}$, (d) π , (e) 6π , (f) 10π , (g) $R = -2\pi\sqrt{3}$; (28) (a) $-\frac{8}{3}$; (b) 2π ; (c) $-3/10$; (29) 4π , $(\frac{16}{3\pi}, 0)$; (30) $2\pi^2$; (31) (a) $-1/12$, (b) $-1/6$, (c) $1/3$, (d) 0, (e) 2π , (f) $\frac{3\pi}{2}$, (g) π , (h) $\pi + \frac{16}{3}[\frac{1}{\sqrt{2}} - 1]$; (34) $3\pi/8$; (35) (c) $\frac{9}{2}$; (36) (a) $e^{-2} - e^2 + \frac{125}{2}\pi$; (b) $4 - \frac{3\pi}{4}$; (c) 4; (37) (a) -2π ; (b) $\frac{1}{2} \ln \frac{29}{5}$; (c) 2π ; (d) π ; (38) $25 \sin 1 - 1$; (39) (a) 0 ou -2π ; (b) 0 ou $-\frac{\pi}{3}$; (40) $I_1 = 2\pi$; $I_2 = 6\pi$; $I_3 = -2\pi$; (41) (a) -8π ; (b) -14π ; (43) $2k\pi$, com k inteiro; (44) (a) não; (b) $\varphi = x^2 e^y + xy - y^2 + c$; (c) não; (d) $\varphi = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + zx - zy + c$; (e) $\varphi = y^2 \sin x + xz^3 - 4y + 2z + c$; (f) não; (g) $\varphi = \arctan(y/x)$; (h) $\varphi = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{2} + c$; (45) π ; (46) (a) 1, (b) $3 \ln 3 - 2$, (c) $-\frac{\pi}{2}$; (47) (a) $a^2 b - \frac{b^3}{3} - \frac{2}{3}$; (b) $a \sin b$; (48) (a) -2 , (b) $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\frac{\sqrt{2}\pi}{8}\right)$; (49) $\ln 2$; (51) (a) $-\frac{1}{11}$; (b) $\frac{1}{2}$.