

GABARITO DA PRIMEIRA PROVA - 03/12/2020

Questão 1 Calcule as integrais a seguir:

(a) **(20 pontos)** $\int_{\gamma} (x+y)^2 ds$, onde γ é o arco da circunferência $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$

Solução. Parametrizando γ como $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq \pi$, temos que $|\gamma'(t)| = 1$ e

$$\int_{\gamma} (x+y)^2 ds = \int_0^\pi (\cos t + \sin t)^2 dt = \int_0^\pi (1 + 2\sin t \cos t) dt = \pi + \left[-\frac{\cos(2t)}{2} \right]_0^\pi = \pi.$$

■

(b) **(20 pontos)** $\int_{\gamma} (x+y)dx + y^2 dy$, onde γ é o arco de parábola $x = y^2$ percorrido de $(0,0)$ a $(1,1)$

Solução. Escrevendo $\gamma(t) = (t^2, t)$, $0 \leq t \leq 1$, temos

$$\int_{\gamma} (x+y)dx + y^2 dy = \int_0^1 [(t^2 + t)(2t) + t^2] dt = \int_0^1 (2t^3 + 3t^2) dt = \frac{3}{2}.$$

■

Questão 2 Calcule as integrais de linha abaixo (cada item vale **(20 pontos)**):

(a)

$$\int_{\gamma} (e^{x^2 \operatorname{sen} x} - xy^3) dx + (\ln(7 + y^{2020}) + x) dy,$$

onde γ é a circunferência $x^2 + y^2 = 4$ orientada no sentido anti-horário

Solução. Pelo Teorema de Green,

$$\int_{\gamma} (e^{x^2 \operatorname{sen} x} - xy^3) dx + (\ln(7 + y^{2020}) + x) dy = \iint_D (1 + 3xy^2) dxdy = 4\pi,$$

onde usamos o fato que a expressão xy^2 é ímpar em x e a região D é simétrica em relação ao eixo x , para concluir que $\iint_D xy^2 dxdy = 0$.

■

(b)

$$\int_{\gamma} (y^3 - ye^{xy}) dx + (3xy^2 - xe^{xy}) dy,$$

onde $\gamma(t) = (1 + t^2, 2\cos(\pi t))$, $0 \leq t \leq 1$

Solução. O campo de vetores $\vec{F}(x, y) = (y^3 - ye^{xy}, 3xy^2 - xe^{xy})$ é conservativo em \mathbb{R}^2 e admite $f(x, y) = xy^3 - e^{xy}$ como potencial, portanto, como $\gamma(0) = (1, 2)$ e $\gamma(1) = (2, -2)$, temos


$$\int_{\gamma} (y^3 - ye^{xy}) dx + (3xy^2 - xe^{xy}) dy = f(2, -2) - f(1, 2) = e^2 - e^{-4} - 24.$$

■

(c)

$$\int_{\gamma} \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2},$$

onde γ é a curva esboçada abaixo, percorrida de $(1, \sqrt{3})$ a $(1, -\sqrt{3})$



Solução. Podemos escrever a integral acima como

$$\underbrace{\int_{\gamma} \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}}_{I_1} + \underbrace{\int_{\gamma} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}}_{I_2} = I_1 + I_2.$$

O campo de vetores $\vec{F}(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$ que aparece em I_1 é conservativo em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, admitindo como potencial a função $f(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$, portanto, $I_1 = f(1, -\sqrt{3}) - f(1, 1) = \frac{1}{2} \ln 2$. Para I_2 , observamos que, conforme discutido em aula,

$$I_2 = -2\pi + \text{Variação de ângulo entre } (1, 1) \text{ e } (1, -\sqrt{3}) = -2\pi - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) = -2\pi - \frac{7\pi}{12} = -\frac{31\pi}{12}.$$

Portanto, $I_1 + I_2 = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{31\pi}{12}$.

■