CMI 022

Álgebra Linear

S2 - 2025

Prof. Fernando de Ávila Silva
Dep. de Matemática - UFPR

ESPAÇOS VETORIAIS

DEFINIÇÃO

Sejam V um conjunto não vazio, $\mathbb{K}$ um corpo ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) e duas operações

$$+ : V \times V \rightarrow V \text{ e } \cdot : \mathbb{K} \times V \rightarrow V.$$

Dizemos que $V = (V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ é um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial, com respeito as operações $+$ e $\cdot$, se as seguintes propriedades são cumpridas:

$$(A1) \quad u + v = v + u, \quad \forall u, v \in V.$$

$$(A2) \quad (u + v) + w = u + (v + w), \quad \forall u, v, w \in V.$$

$$(A3) \quad \text{Existe um elemento } 0 \in V \text{ tal que } v + 0 = v, \quad \forall v \in V.$$

$$(A4) \quad \text{Para cada } v \in V, \text{ existe } u \in V \text{ tal que } v + u = 0.$$

$$(M1) \quad (\alpha\beta) \cdot v = \alpha \cdot (\beta \cdot v), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \text{ e } \forall v \in V.$$

$$(M2) \quad 1 \cdot v = v, \quad \forall v \in V, \text{ sendo } 1 \text{ a identidade de } \mathbb{K}.$$

$$(D1) \quad \alpha \cdot (v + u) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot u, \quad \forall u, v \in V \text{ e } \forall \alpha \in \mathbb{K}.$$

$$(D2) \quad (\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v, \quad \forall v \in V \text{ e } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

COMBINAO LINEAR

DEFINIO

Um vetor $u \in V$ dito uma combinao linear dos vetores $u_1, \dots, u_n \in V$ se existem escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ em $\mathbb{K}$ tais que $u = \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j$.

COMBINAO LINEAR

DEFINIO

Um vetor $u \in V$ dito uma combinao linear dos vetores $u_1, \dots, u_n \in V$ se existem escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ em $\mathbb{K}$ tais que $u = \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j$.

EXEMPLO 1

Em $\mathbb{R}^2$, o vetor $v = (3, 2)$ combinao linear dos vetores $e_1 = (1, 0)$ e $e_2 = (0, 1)$. Mais ainda, todo vetor em $\mathbb{R}^2$ combinao linear de e_1 e e_2 .

COMBINAÇO LINEAR

DEFINIÇO

Um vetor $u \in V$ é dito uma combinaço linear dos vetores $u_1, \dots, u_n \in V$ se existem escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ em $\mathbb{K}$ tais que $u = \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j$.

EXEMPLO 1

Em $\mathbb{R}^2$, o vetor $v = (3, 2)$ é combinaço linear dos vetores $e_1 = (1, 0)$ e $e_2 = (0, 1)$. Mais ainda, todo vetor em $\mathbb{R}^2$ é combinaço linear de e_1 e e_2 .

EXEMPLO 2

Em $\mathbb{R}^2$, o vetor $v = (3, 2)$ no é combinaço linear dos vetores $v_1 = (1, 0)$ e $v_2 = (3, 0)$.

COMBINAO LINEAR

DEFINIO

Um vetor $u \in V$ dito uma combinao linear dos vetores $u_1, \dots, u_n \in V$ se existem escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ em $\mathbb{K}$ tais que $u = \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j$.

EXEMPLO 1

Em $\mathbb{R}^2$, o vetor $v = (3, 2)$ combinao linear dos vetores $e_1 = (1, 0)$ e $e_2 = (0, 1)$. Mais ainda, todo vetor em $\mathbb{R}^2$ combinao linear de e_1 e e_2 .

EXEMPLO 2

Em $\mathbb{R}^2$, o vetor $v = (3, 2)$ no combinao linear dos vetores $v_1 = (1, 0)$ e $v_2 = (3, 0)$.

EXEMPLO 3

Em $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ todo funo combinao linear de uma funo par com uma funo mpar.

CONJUNTOS LINEARMENTE INDEPENDENTES

CONJUNTOS LINEARMENTE INDEPENDENTES

DEFINIÇÃO

Seja V um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial e $A = \{u_1, \dots, u_n\}$ um conjunto de vetores em V . Dizemos que A é um conjunto **linearmente independente** se

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

CONJUNTOS LINEARMENTE INDEPENDENTES

DEFINIÇÃO

Seja V um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial e $A = \{u_1, \dots, u_n\}$ um conjunto de vetores em V . Dizemos que A é um conjunto **linearmente independente** se

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

DEFINIÇÃO

Seja V um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial e $A = \{u_1, \dots, u_n\}$ um conjunto de vetores em V . Dizemos que A é um conjunto **linearmente dependente** se for possível obter escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ em $\mathbb{K}$, **não todos nulos** tais que

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j = 0.$$

EXEMPLOS EM $\mathbb{R}^3$

EXEMPLO 1

Vamos verificar quais conjuntos abaixo são L.I. e quais são L.D.

- (a) $\{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (1, 0, 0)\}$.
- (b) $\{v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (0, 1, 0)\}$.
- (c) $\{v_1 = (1, 2, 4), v_2 = (2, 1, 3), v_3 = (4, -1, 1)\}$.

UM PRIMEIRO RESULTADO

- Considere um conjunto de n vetores $A = \{v_1, \dots, v_n\}$ em $\mathbb{R}^n$ e sejam $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j = 0$$

- Escrevendo

$$v_j = (v_{1,j}, \dots, v_{n,j}) \text{ e } x = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

temos o sistema

$$A \cdot x = 0,$$

em que A é matriz cujas colunas são os vetores $v_1, \dots, v_n$.

UM PRIMEIRO RESULTADO

- Considere um conjunto de n vetores $A = \{v_1, \dots, v_n\}$ em $\mathbb{R}^n$ e sejam $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j v_j = 0$$

- Escrevendo

$$v_j = (v_{1,j}, \dots, v_{n,j}) \text{ e } x = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

temos o sistema

$$A \cdot x = 0,$$

em que A é matriz cujas colunas são os vetores $v_1, \dots, v_n$.

TEOREMA 1

Um conjunto de n vetores $A = \{v_1, \dots, v_n\}$ em $\mathbb{R}^n$ é L.I. se, e somente se, $\det(A) \neq 0$.

EXEMPLOS EM ESPAÇOS DE FUNÇÕES

EXEMPLO 2

Considere $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$. Então, o conjunto $\{f_1, f_2\}$, com $f_1(x) = \cos(x)$ e $f_2(x) = \sin(x)$ é linearmente independente.

UM RESULTADO GERAL

TEOREMA 2

Seja $A = \{v_1, \dots, v_n\}$ um conjunto de vetores não nulos em um espaço vetorial V . Se nenhum deles é combinação linear dos demais, então A é L.I.

IMPORTANTE**TEOREMA 3**

Sejam V um espaço vetorial e A um subconjunto de V . Então, V é linearmente independente se, e somente se, todo subconjunto finito de A é linearmente independente.

EXEMPLO 3

Em $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ o conjunto $A = \{f_j, j \in \mathbb{N}\}$, em que

$$f_j(x) = e^{ix},$$

é linearmente independente.