CMI 022

Álgebra Linear

S2 - 2025

Prof. Fernando de Ávila Silva
Dep. de Matemática - UFPR

SUBESPAÇOS VETORIAIS

DEFINIÇÃO

Um subespaço de um espaço vetorial V é um subconjunto $S \subset V$ que satisfaz as seguintes propriedades:

$$(S1) \quad 0 \in S.$$

$$(S2) \quad u + v \in S, \quad \forall u, v \in S.$$

$$(S3) \quad \lambda u \in S, \quad \forall u \in S, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}.$$

SUBESPAÇOS VETORIAIS

DEFINIÇÃO

Um subespaço de um espaço vetorial V é um subconjunto $S \subset V$ que satisfaz as seguintes propriedades:

$$(S1) \quad 0 \in S.$$

$$(S2) \quad u + v \in S, \quad \forall u, v \in S.$$

$$(S3) \quad \lambda u \in S, \quad \forall u \in S, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}.$$

OBSERVAÇÕES

- Se S é um subespaço, então $(S, \mathbb{K}, +, \cdot)$ é espaço vetorial, sendo $+$ e $\cdot$ as operações de V . Por isso o nome **subespaço vetorial**.

SUBESPAÇOS VETORIAIS

DEFINIÇÃO

Um subespaço de um espaço vetorial V é um subconjunto $S \subset V$ que satisfaz as seguintes propriedades:

$$(S1) \quad 0 \in S.$$

$$(S2) \quad u + v \in S, \quad \forall u, v \in S.$$

$$(S3) \quad \lambda u \in S, \quad \forall u \in S, \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}.$$

OBSERVAÇÕES

- Se S é um subespaço, então $(S, \mathbb{K}, +, \cdot)$ é espaço vetorial, sendo $+$ e $\cdot$ as operações de V . Por isso o nome **subespaço vetorial**.
- Qualquer combinação linear de elementos de um subespaço ainda pertence ao subespaço, isto é, se $u_1, \dots, u_n \in S$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, então

$$u = \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \in S.$$

EXEMPLOS

EXEMPLO BEM SIMPLES

- Todo espaço vetorial V é um subespaço dele.

EXEMPLOS

EXEMPLO BEM SIMPLES

- Todo espaço vetorial V é um subespaço dele.
- O conjunto $\{0\}$ é um subespaço. (Subespaço trivial).

EXEMPLOS

EXEMPLO BEM SIMPLES

- Todo espaço vetorial V é um subespaço dele.
- O conjunto $\{0\}$ é um subespaço. (Subespaço trivial).
- Seja v um vetor não nulo em V . Temos então o subespaço

EXEMPLOS

EXEMPLO BEM SIMPLES

- Todo espaço vetorial V é um subespaço dele.
- O conjunto $\{0\}$ é um subespaço. (Subespaço trivial).
- Seja v um vetor não nulo em V . Temos então o subespaço

$$\mathcal{R}_v = \{\alpha v, \forall \alpha \in \mathbb{K}\}.$$

EXEMPLOS

EXEMPLO BEM SIMPLES

- Todo espaço vetorial V é um subespaço dele.
- O conjunto $\{0\}$ é um subespaço. (Subespaço trivial).
- Seja v um vetor não nulo em V . Temos então o subespaço

$$\mathcal{R}_v = \{\alpha v, \forall \alpha \in \mathbb{K}\}.$$

FUNÇÕES

Considere $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ o espaço das funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Temos então os subespaços:

EXEMPLOS

EXEMPLO BEM SIMPLES

- Todo espaço vetorial V é um subespaço dele.
- O conjunto $\{0\}$ é um subespaço. (Subespaço trivial).
- Seja v um vetor não nulo em V . Temos então o subespaço

$$\mathcal{R}_v = \{\alpha v, \forall \alpha \in \mathbb{K}\}.$$

FUNÇÕES

Considere $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ o espaço das funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Temos então os subespaços:

- $S = \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$, das funções contínuas.

EXEMPLOS

EXEMPLO BEM SIMPLES

- Todo espaço vetorial V é um subespaço dele.
- O conjunto $\{0\}$ é um subespaço. (Subespaço trivial).
- Seja v um vetor não nulo em V . Temos então o subespaço

$$\mathcal{R}_v = \{\alpha v, \forall \alpha \in \mathbb{K}\}.$$

FUNÇÕES

Considere $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ o espaço das funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Temos então os subespaços:

- $S = \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$, das funções contínuas.
- $W = \mathcal{C}^{(k)}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$, das funções diferenciáveis de ordem k .

EXEMPLOS

EXEMPLO BEM SIMPLES

- Todo espaço vetorial V é um subespaço dele.
- O conjunto $\{0\}$ é um subespaço. (Subespaço trivial).
- Seja v um vetor não nulo em V . Temos então o subespaço

$$\mathcal{R}_v = \{\alpha v, \forall \alpha \in \mathbb{K}\}.$$

FUNÇÕES

Considere $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ o espaço das funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Temos então os subespaços:

- $S = \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$, das funções contínuas.
- $W = \mathcal{C}^{(k)}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$, das funções diferenciáveis de ordem k .
- $Z = \mathcal{P}(\mathbb{R})$ dos polinômios.

INTERSECÇÃO

Se S_λ , $\lambda \in L$, é uma coleção de subespaços vetoriais de V , sendo L um conjunto qualquer de índices, então o conjunto

$$S = \bigcap_{\lambda \in L} S_\lambda,$$

é um subespaço.

INTERSECÇÃO

Se S_λ , $\lambda \in L$, é uma coleção de subespaços vetoriais de V , sendo L um conjunto qualquer de índices, então o conjunto

$$S = \bigcap_{\lambda \in L} S_\lambda,$$

é um subespaço.

HIPERPLANO

Considere $V = \mathbb{K}^n$ um espaço vetorial e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ escalares fixados. Temos então o subespaço $S \subset \mathbb{K}^n$ formado por todos os vetores $x = (x_1, \dots, x_n)$ soluções da equação

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0.$$

INTERSECÇÃO

Se S_λ , $\lambda \in L$, é uma coleção de subespaços vetoriais de V , sendo L um conjunto qualquer de índices, então o conjunto

$$S = \bigcap_{\lambda \in L} S_\lambda,$$

é um subespaço.

HIPERPLANO

Considere $V = \mathbb{K}^n$ um espaço vetorial e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ escalares fixados. Temos então o subespaço $S \subset \mathbb{K}^n$ formado por todos os vetores $x = (x_1, \dots, x_n)$ soluções da equação

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0.$$

SISTEMAS

O conjunto das soluções do sistema homogêneo

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

é um subespaço de $\mathbb{K}^n$.

EXEMPLO: SOLUÇÕES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

EXEMPLO

O conjunto de soluções da equação diferencial homogênea

$$ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0$$

é um subespaço vetorial de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}; \mathbb{R})$.

NÚCLEO E IMAGEM DE UMA MATRIZ

NÚCLEO E IMAGEM DE UMA MATRIZ

NÚCLEO

Seja $A_{m \times n}$ uma matriz com entradas em $\mathbb{K}$. Então, o conjunto

$$N(A) = \{x \in \mathbb{K}^n; A \cdot x = 0\}$$

é um subespaço de $\mathbb{K}^n$ chamado de **núcleo** de A .

NÚCLEO E IMAGEM DE UMA MATRIZ

NÚCLEO

Seja $A_{m \times n}$ uma matriz com entradas em $\mathbb{K}$. Então, o conjunto

$$N(A) = \{x \in \mathbb{K}^n; A \cdot x = 0\}$$

é um subespaço de $\mathbb{K}^n$ chamado de **núcleo** de A .

IMAGEM

Seja $A_{m \times n}$ uma matriz com entradas em $\mathbb{K}$. Então, o conjunto

$$Im(A) = \{y \in \mathbb{K}^m; A \cdot x = y, \text{ para algum } x \in \mathbb{K}^n\}$$

é um subespaço de $\mathbb{K}^m$ chamado de **imagem** de A .

NÚCLEO E IMAGEM DE UMA MATRIZ

NÚCLEO

Seja $A_{m \times n}$ uma matriz com entradas em $\mathbb{K}$. Então, o conjunto

$$N(A) = \{x \in \mathbb{K}^n; A \cdot x = 0\}$$

é um subespaço de $\mathbb{K}^n$ chamado de **núcleo** de A .

IMAGEM

Seja $A_{m \times n}$ uma matriz com entradas em $\mathbb{K}$. Então, o conjunto

$$Im(A) = \{y \in \mathbb{K}^m; A \cdot x = y, \text{ para algum } x \in \mathbb{K}^n\}$$

é um subespaço de $\mathbb{K}^m$ chamado de **imagem** de A .

EXEMPLO

Determinar $N(A)$ e $Im(A)$ da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

SUBESPAÇOS GERADOS

SUBESPAÇOS GERADOS

DEFINIÇÃO

Dado um conjunto não vazio A em um espaço vetorial V denotamos por $ger(A)$ o conjunto de todas as combinações lineares de vetores em A , isto é,

$$ger(A) = \left\{ v = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j, \alpha_j \in \mathbb{K}, v_j \in A \right\}.$$

SUBESPAÇOS GERADOS

DEFINIÇÃO

Dado um conjunto não vazio A em um espaço vetorial V denotamos por $ger(A)$ o conjunto de todas as combinações lineares de vetores em A , isto é,

$$ger(A) = \left\{ v = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j, \alpha_j \in \mathbb{K}, v_j \in A \right\}.$$

- Temos que $ger(A)$ é um subespaço de V que é chamado de **espaço gerado** por A .
- Quando for $V = ger(A)$, então dizemos que A é um conjunto **gerador** de V .

EXEMPLOS

EXEMPLOS

BASE CANÔNICA DE $\mathbb{K}^n$

O conjunto $\beta = \{e_j, j = 1, \dots, n\}$ é um gerador de $\mathbb{K}^n$, sendo $e_j \in \mathbb{K}^n$ o vetor cujas entradas são iguais 1 na posição j e 0 nas demais.

EXEMPLOS

BASE CANÔNICA DE $\mathbb{K}^n$

O conjunto $\beta = \{e_j, j = 1, \dots, n\}$ é um gerador de $\mathbb{K}^n$, sendo $e_j \in \mathbb{K}^n$ o vetor cujas entradas são iguais 1 na posição j e 0 nas demais.

ESPAÇO COLUNA DE UMA MATRIZ

Considere uma matriz $A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{K})$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

EXEMPLOS

BASE CANÔNICA DE $\mathbb{K}^n$

O conjunto $\beta = \{e_j, j = 1, \dots, n\}$ é um gerador de $\mathbb{K}^n$, sendo $e_j \in \mathbb{K}^n$ o vetor cujas entradas são iguais a 1 na posição j e 0 nas demais.

ESPAÇO COLUNA DE UMA MATRIZ

Considere uma matriz $A \in \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{K})$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

O espaço coluna de A é o subespaço $\mathcal{C}_A$ de $\mathbb{K}^n$ gerado pelos n vetores construídos através das colunas de A , isto é, tomamos o conjunto de vetores

$$v_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}), v_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{m2}), \dots, v_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn})$$

e definimos

$$\mathcal{C}_A = \text{ger}(\{v_1, \dots, v_n\}).$$

SOMAS DE SUBESPAÇOS

DEFINIÇÃO

Sejam V um espaço vetorial e A, B dois subconjuntos, não vazios, quaisquer. Definimos então o conjunto

$$A + B = \{c = a + b \in V; a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

SOMAS DE SUBESPAÇOS

DEFINIÇÃO

Sejam V um espaço vetorial e A, B dois subconjuntos, não vazios, quaisquer. Definimos então o conjunto

$$A + B = \{c = a + b \in V; a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

LEMA

Se A, B são subespaços, então $A + B$ também é subespaço.

EXEMPLOS

MATRIZES

Sejam $\mathcal{S}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ e $\mathcal{A}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ os espaços das matrizes simétricas e anti-simétricas, respectivamente.

EXEMPLOS

MATRIZES

Sejam $\mathcal{S}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ e $\mathcal{A}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ os espaços das matrizes simétricas e anti-simétricas, respectivamente.

- $\mathcal{S}_n$ e $\mathcal{A}_n$ são subespaços de $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.

EXEMPLOS

MATRIZES

Sejam $\mathcal{S}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ e $\mathcal{A}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ os espaços das matrizes simétricas e anti-simétricas, respectivamente.

- $\mathcal{S}_n$ e $\mathcal{A}_n$ são subespaços de $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.
- $\mathcal{S}_n + \mathcal{A}_n = \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.

EXEMPLOS

MATRIZES

Sejam $\mathcal{S}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ e $\mathcal{A}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ os espaços das matrizes simétricas e anti-simétricas, respectivamente.

- $\mathcal{S}_n$ e $\mathcal{A}_n$ são subespaços de $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.
- $\mathcal{S}_n + \mathcal{A}_n = \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.

FUNÇÕES

Sejam $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ e $\mathcal{B} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ os espaços das funções pares e ímpares, respectivamente.

EXEMPLOS

MATRIZES

Sejam $\mathcal{S}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ e $\mathcal{A}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ os espaços das matrizes simétricas e anti-simétricas, respectivamente.

- $\mathcal{S}_n$ e $\mathcal{A}_n$ são subespaços de $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.
- $\mathcal{S}_n + \mathcal{A}_n = \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.

FUNÇÕES

Sejam $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ e $\mathcal{B} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ os espaços das funções pares e ímpares, respectivamente.

- $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ são subespaços de $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$.

EXEMPLOS

MATRIZES

Sejam $\mathcal{S}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ e $\mathcal{A}_n \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ os espaços das matrizes simétricas e anti-simétricas, respectivamente.

- $\mathcal{S}_n$ e $\mathcal{A}_n$ são subespaços de $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.
- $\mathcal{S}_n + \mathcal{A}_n = \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$.

FUNÇÕES

Sejam $\mathcal{A} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ e $\mathcal{B} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ os espaços das funções pares e ímpares, respectivamente.

- $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ são subespaços de $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$.
- $\mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$.