CMI 022

Álgebra Linear

S2 - 2025

Prof. Fernando de Ávila Silva
Dep. de Matemática - UFPR

BASE

DEFINIÇÃO

Seja V um espaço vetorial.

- (a) Uma base de V é um conjunto de vetores β que é L.I. e gera todo o espaço V .
- (b) V é dito finitamente gerado se existe um conjunto com finitos vetores que gera V .

TEOREMA

- (a) Todo espaço finitamente gerado, não trivial, possui base.
- (b) Se V é finitamente gerado, então todas as bases de V tem a mesma quantidade de elementos.
- (c) Um conjunto com n vetores em $\mathbb{K}^n$ é uma base se, e somente se, $\det(A) \neq 0$, em que A é a matriz cujas colunas são tais vetores. (O mesmo vale se utilizarmos a matriz cujas linhas são esses vetores).

DEFINIÇÃO

A dimensão de um $\mathbb{K}$ -espaço vetorial V finitamente gerado é quantidade de elementos em uma de suas bases. Iremos escrever $\dim_{\mathbb{K}} V$.

OBSERVAÇÕES

- Se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base de V , então para cada $v \in V$, existem únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tais que

$$v = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j.$$

OBSERVAÇÕES

- Se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base de V , então para cada $v \in V$, existem únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tais que

$$v = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j.$$

- Os escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ são ditos **coordenadas de v** com respeito a base β .

OBSERVAÇÕES

- Se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base de V , então para cada $v \in V$, existem únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tais que

$$v = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j.$$

- Os escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ são ditos **coordenadas de v** com respeito a base β .
- Nas condições acima, podemos associar a cada vetor $v \in V$ o vetor $v_\beta \in \mathbb{K}^n$ dado por

$$v_\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_\beta$$

OBSERVAÇÕES

- Se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base de V , então para cada $v \in V$, existem únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tais que

$$v = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j.$$

- Os escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ são ditos **coordenadas de v** com respeito a base β .
- Nas condições acima, podemos associar a cada vetor $v \in V$ o vetor $v_\beta \in \mathbb{K}^n$ dado por

$$v_\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_\beta$$

PROPOSIÇÃO

Sejam V um espaço de dimensão $n \geq 1$ e β um subconjunto de V com n elementos. As seguintes afirmações são equivalentes.

OBSERVAÇÕES

- Se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é uma base de V , então para cada $v \in V$, existem únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tais que

$$v = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j.$$

- Os escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ são ditos **coordenadas de v** com respeito a base β .
- Nas condições acima, podemos associar a cada vetor $v \in V$ o vetor $v_\beta \in \mathbb{K}^n$ dado por

$$v_\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)_\beta$$

PROPOSIÇÃO

Sejam V um espaço de dimensão $n \geq 1$ e β um subconjunto de V com n elementos. As seguintes afirmações são equivalentes.

- β é uma base.
- β é L.I.
- β é um gerador de V .

EXEMPLOS

EXEMPLO 1

Considere o conjunto

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + y - z = 0\}$$

- (a) Vamos verificar que S é um subespaço de $\mathbb{R}^3$.
- (b) Vamos obter uma base para S .

EXEMPLO 2

Considere o conjunto

$$S = \{A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R}); A^t = A\}$$

- (a) Vamos verificar que S é um subespaço de $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$.
- (b) Vamos obter uma base para S .

EXEMPLOS

EXEMPLO 3

Considere o conjunto

$$N(A) = \{v = (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4; A \cdot v = 0, \}$$

sendo A a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Vamos verificar que $N(A)$ é um subespaço de $\mathbb{R}^4$.
- (b) Vamos obter uma base para $N(A)$.

FORMA DEGRAU

DEFINIÇÃO 1

Dizemos que uma matriz está na sua forma **linha degrau** se:

- O primeiro elemento não nulo em cada linha não nula é 1.
- Se a linha k não consiste apenas de zeros, então o número de zeros iniciais da linha $k + 1$ é maior que o número de zeros iniciais que na linha k .
- Se há linhas nulas, então elas estão abaixo daquelas que não são nulas.

FORMA DEGRAU

DEFINIÇÃO 1

Dizemos que uma matriz está na sua forma **linha degrau** se:

- O primeiro elemento não nulo em cada linha não nula é 1.
- Se a linha k não consiste apenas de zeros, então o número de zeros iniciais da linha $k + 1$ é maior que o número de zeros iniciais que na linha k .
- Se há linhas nulas, então elas estão abaixo daquelas que não são nulas.

DEFINIÇÃO 2

Dizemos que uma matriz está na sua forma **linha degrau reduzida** se:

- Está na sua forma linha degrau.
- O primeiro elemento não nulo em cada linha é o único não nulo em sua coluna.

ESPAÇO LINHA DE UMA MATRIZ

DEFINIÇÃO

Considere uma matriz $A \in \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{K})$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ESPAÇO LINHA DE UMA MATRIZ

DEFINIÇÃO

Considere uma matriz $A \in \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{K})$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

O **espaço linha** de A é o subespaço $\mathcal{E}_L(A)$ de $\mathbb{K}^m$ gerado pelos m vetores construídos através das **linhas** de A , isto é, denotando

$$v_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), v_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, v_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$$

temos que $\mathcal{E}_L(A) = \text{ger}(\{v_1, \dots, v_m\})$.

O **posto** de uma matriz $A \in \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{K})$ é a dimensão do seu espaço linha.

COMO OBTER UMA BASE PARA O ESPAÇO LINHA?

PROPOSIÇÃO

São válidas as seguintes propriedades:

- (a) Se duas matrizes A e B são linha-equivalentes, então $\mathcal{E}_L(A) = \mathcal{E}_L(B)$
- (b) As linhas não nulas da matriz *linha degrau* formam uma base para o espaço linha.
- (c) Se A é uma matriz $m \times n$, então o posto de A somado com a dimensão de $N(A)$ é igual n , ou seja,

$$\dim[\mathcal{E}_L(A)] + \dim[N(A)] = n$$

EXEMPLOS**EXEMPLOS**

Vamos obter uma base para os espaços linha de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$