

“VALE A PENA RELEMBRAR AOS CRIADORES DE OVINOS”

SOBRE A IDADE DE DESMAME DOS CORDEIROS

Nelson Manzoni de Oliveira¹
José Carlos Ferrugem Moraes¹
Vicente Celestino Pires da Silveira¹
Marcos Flávio Silva Borba¹



Um levantamento sobre a produção ovina mostrou uma tendência dos produtores adotarem períodos de aleitamento relativamente longos. As idades de 4 meses (31% dos produtores) e 5 meses (40% dos produtores) foram as preferenciais. No entanto, várias pesquisas indicam que não há inconveniente em desmamar mais cedo, uma vez que os cordeiros, com cerca de 8 semanas de idade, já possuem uma eficiente digestão, podendo ser comparada a de um animal adulto. Quando as condições adequadas são oferecidas aos cordeiros (pasto de boa qualidade), não existe um efeito significativo na redução da taxa de crescimento. Quando o objetivo da exploração consiste na produção de cordeiros/borregos para abate, é necessário um manejo alimentar adequado que permita uma rápida terminação do cordeiro e a obtenção de uma carcaça com características adequadas ao consumo. Assim, a identificação e utilização de uma idade mínima ideal de desmame, é essencial ao potencial produtivo posterior do animal, em outro manejo alimentar.

Aqui comentamos a importância da:

IDADE DO DESMAME

Resultados de pesquisa realizada com a raça Corriedale, mostraram a tendência observada no gráfico abaixo, quando se desmama cordeiros às 8, 10, 12 e 14 semanas.

**Peso vivo de cordeiros desmamados
em diferentes idades**



¹ Méd. Vet., Pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Caixa Postal 242, CEP 96400-970, Bagé-RS

Comparados com o grupo que não foi desmamado até as 22 semanas de idade (chamado de SD no gráfico), os pesos dos cordeiros foram levemente inferiores. Entre os desmamados, no entanto, a diferença foi mínima e sem importância, desde o ponto de vista de comprometer seu futuro desenvolvimento, devido ao desmame. Nosso ponto de vista é de que, nas condições extensivas de criação em campo nativo encontrado em nosso meio e com cuidados sanitários, os cordeiros podem ser desmamados entre:

10 E 12 SEMANAS DE IDADE

POIS

- Em condições de pastoreio, o leite materno é de pouca importância após dez semanas de idade;
- Os cordeiros não têm seu crescimento afetado;
- Há vantagens na recuperação das ovelhas para o próximo acasalamento ou inseminação;
- Diminui a contaminação dos cordeiros, com parasitos provenientes das ovelhas;
- Os cordeiros podem ser transferidos para outros sistemas de alimentação, para terminação de carcaça;
- O peso e a qualidade do velo das ovelhas não sofrem os efeitos de aleitamentos prolongados, uma vez que a lactação, sem adequada alimentação materna, é o que mais prejudica a qualidade da fibra de lã e, desta forma, o valor de mercado pago pelo velo.

CONCLUINDO, PODEMOS DIZER QUE:

**Os rebanhos destes pampas
Com toda nossa atenção
Vão produzir cordeiros
Dignos de admiração**

**Mas para isto acontecer
Que o produtor conclame
Resultados da pesquisa
Aquela que sintetiza
Sobre a idade do desmame**

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Consulte a Área de Comunicação Empresarial e Negócios Tecnológicos da Embrapa Pecuária Sul - BR 153, km 595, Caixa Postal 242, Vila Industrial, Bagé - RS, CEP 96400-970 - Fone/Fax: (53) 242-8499; <http://www.cppsul.embrapa.br> - sac@cppsul.embrapa.br
- ou Médico Veterinário/Engenheiro Agrônomo da sua Cooperativa, da Agroindústria, do Serviço de Extensão Rural ou da Defesa Sanitária do seu município, ou profissional habilitado.

**Ministério da
Agricultura e do
Abastecimento**

**GOVERNO
FEDERAL**