

Teorema 6.1.1. Sejam A e B matrizes $n \times n$. Se B é semelhante a A , então as duas matrizes têm o mesmo polinômio característico e, portanto, os mesmos autovalores.

Demonstração. Vamos denotar por $p_A(x)$ e $p_B(x)$ os polinômios característicos de A e B , respectivamente. Se B é semelhante a A , existe uma matriz invertível S tal que $B = S^{-1}AS$. Temos, então,

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I) \\ &= \det(S^{-1}AS - \lambda I) \\ &= \det(S^{-1}(A - \lambda I)S) \\ &= \det(S^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(S) \\ &= p_A(\lambda) \end{aligned}$$

Os autovalores da matriz são as raízes do polinômio característico. Como as duas matrizes têm o mesmo polinômio característico, elas têm que ter os mesmos autovalores. \square

EXEMPLO 6. Sejam

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad S = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

É fácil ver que os autovalores de T são $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$. Definindo $A = S^{-1}TS$, os autovalores de A devem ser iguais aos de T .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$$

Deixamos a cargo do leitor a verificação de que os autovalores dessa matriz são $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$. \square

EXERCÍCIOS

1. Encontre os autovalores e os auto-espços correspondentes de cada uma das matrizes a seguir.

(a) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 3 & -8 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(g) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(h) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}$

(i) $\begin{pmatrix} 4 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(j) $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

(k) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

(l) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

2. Mostre que os autovalores de uma matriz triangular são os elementos diagonais da matriz.
3. Seja A uma matriz $n \times n$. Mostre que A é singular se e somente se $\lambda = 0$ é um autovalor de A .
4. Seja A uma matriz invertível e seja λ um autovalor de A . Mostre que $1/\lambda$ é um autovalor de A^{-1} .
5. Seja λ um autovalor de A e seja \mathbf{x} um autovetor associado. Use indução matemática para mostrar que λ^m é um autovalor de A^m e que \mathbf{x} é um autovetor de A^m associado a λ^m para $m = 1, 2, \dots$
6. Uma matriz A $n \times n$ é dita idempotente se $A^2 = A$. Mostre que, se λ é um autovalor de uma matriz idempotente, então λ tem que ser igual a 0 ou a 1.
7. Uma matriz A $n \times n$ é dita nilpotente se $A^k = O$ para algum inteiro positivo k . Mostre que todos os autovalores de uma matriz nilpotente são nulos.
8. Seja A uma matriz $n \times n$ e seja $B = A - \alpha I$, onde α é um escalar. Qual a relação entre os autovalores de A e de B ? Explique.
9. Mostre que A e A^T têm os mesmos autovalores. Elas têm necessariamente os mesmos autovetores? Explique.
10. Mostre que a matriz

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

vai ter autovalores complexos se θ não for um múltiplo de π . Interprete esse resultado geometricamente.

11. Seja A uma matriz 2×2 . Se $\operatorname{tr}(A) = 8$ e $\det(A) = 12$, quais são os autovalores de A ?
12. Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz $n \times n$ com autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Mostre que

$$\lambda_j = a_{jj} + \sum_{i \neq j} (a_{ii} - \lambda_i) \quad \text{para } j = 1, \dots, n$$

13. Seja A uma matriz 2×2 e seja $p(\lambda) = \lambda^2 + b\lambda + c$ o polinômio característico de A . Mostre que $b = -\operatorname{tr}(A)$ e que $c = \det(A)$.
14. Seja λ um autovalor não-nulo de A e seja \mathbf{x} um autovetor associado. Mostre que $A^m \mathbf{x}$ também é um autovetor associado a λ para $m = 1, 2, \dots$
15. Seja A uma matriz $n \times n$ e seja λ um autovalor de A . Se $A - \lambda I$ tem posto k , qual é a dimensão do auto-espaço associado a λ ? Explique.
16. Seja A uma matriz $n \times n$. Mostre que um vetor \mathbf{x} em R^n é um autovetor de A se e somente se o subespaço S de R^n gerado por \mathbf{x} e $A\mathbf{x}$ tem dimensão 1.
17. Sejam $\alpha = a + bi$ e $\beta = c + di$ escalares complexos e sejam A e B matrizes com coeficientes reais.
 - (a) Mostre que

$$\overline{\alpha + \beta} = \overline{\alpha} + \overline{\beta} \quad \text{e} \quad \overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\overline{\beta}$$

- (b) Mostre que os elementos (i, j) de \overline{AB} e de $\overline{A}\overline{B}$ são iguais e, portanto, que

$$\overline{AB} = \overline{A}\overline{B}$$

18. Sejam $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r$ autovetores de uma matriz A $n \times n$ e seja S o subespaço de R^n gerado por $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_r$. Mostre que S é invariante sob A (isto é, mostre que $A\mathbf{x} \in S$ sempre que $\mathbf{x} \in S$).
19. Seja $B = S^{-1}AS$ e seja \mathbf{x} um autovetor de B associado a um autovalor λ . Mostre que $S\mathbf{x}$ é um autovetor de A associado a λ .
20. Mostre que, se duas matrizes A e B têm um autovetor em \mathbf{x} em comum (mas não necessariamente um autovalor em comum), então \mathbf{x} é também um autovetor de qualquer matriz da forma $C = \alpha A + \beta B$.
21. Seja A uma matriz $n \times n$ e seja λ um autovalor de A . Mostre que, se \mathbf{x} é um autovetor associado a λ , então \mathbf{x} pertence ao espaço coluna de A .
22. Seja $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ uma base ortonormal para R^n e sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ escalares. Defina

$$A = \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \lambda_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n \mathbf{u}_n^T$$

Mostre que A é uma matriz simétrica com autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ e que \mathbf{u}_i é um autovetor associado a λ_i para cada i .