

O item (d) pode ser resolvido de maneira semelhante a (b). Se

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

então

$$\begin{aligned} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 &= a \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 &= b \\ 4\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 &= c \end{aligned}$$

Nesse caso, no entanto, a matriz de coeficientes é singular. O método de Gauss nos leva a um sistema da forma

$$\begin{aligned} \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 &= a \\ \alpha_2 + 3\alpha_3 &= \frac{2a - b}{3} \\ 0 &= 2a - 3c + 5b \end{aligned}$$

Se

$$2a - 3c + 5b \neq 0$$

então o sistema é incompatível. Portanto, para a maioria das escolhas para  $a, b, c$ , é impossível expressar  $(a, b, c)^T$  como uma combinação linear de  $(1, 2, 4)^T, (2, 1, 3)^T, (4, -1, 1)^T$ . Os vetores não geram  $\mathbb{R}^3$ .  $\square$

**EXEMPLO 12.** Os vetores  $1 - x^2, x + 2$  e  $x^2$  geram  $P_3$ . Então, se  $ax^2 + bx + c$  é qualquer polinômio em  $P_3$ , é possível encontrar escalares  $\alpha_1, \alpha_2$  e  $\alpha_3$  tais que

$$ax^2 + bx + c = \alpha_1(1 - x^2) + \alpha_2(x + 2) + \alpha_3x^2$$

De fato,

$$\alpha_1(1 - x^2) + \alpha_2(x + 2) + \alpha_3x^2 = (\alpha_3 - \alpha_1)x^2 + \alpha_2x + (\alpha_1 + 2\alpha_2)$$

Fazendo

$$\begin{aligned} \alpha_3 - \alpha_1 &= a \\ \alpha_2 &= b \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 &= c \end{aligned}$$

e resolvendo, obtemos  $\alpha_1 = c - 2b$ ,  $\alpha_2 = b$  e  $\alpha_3 = a + c - 2b$ .  $\square$

Vimos, no Exemplo 11(a), que os vetores  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, (1, 2, 3)^T$  geram  $\mathbb{R}^3$ . É claro que  $\mathbb{R}^3$  poderia ser gerado apenas pelos vetores  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ . O vetor  $(1, 2, 3)^T$  não é realmente necessário. Na próxima seção, vamos considerar o problema de encontrar conjuntos geradores mínimos para um espaço vetorial  $V$  (isto é, conjuntos geradores que contêm o menor número possível de vetores).

## EXERCÍCIOS

1. Determine se cada conjunto a seguir é ou não um subespaço de  $\mathbb{R}^2$ .

(a)  $\{(x_1, x_2)^T \mid x_1 + x_2 = 0\}$

(b)  $\{(x_1, x_2)^T \mid x_1 x_2 = 0\}$

(c)  $\{(x_1, x_2)^T \mid x_1 = 3x_2\}$

(d)  $\{(x_1, x_2)^T \mid x_1 = 3x_2 + 1\}$

2. Determine se cada conjunto a seguir é ou não um subespaço de  $\mathbb{R}^3$ .

(a)  $\{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_1 + x_3 = 1\}$

(b)  $\{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_1 = x_2 = x_3\}$

- (c)  $\{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_3 = x_1 + x_2\}$   
 (d)  $\{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_3 = x_1^2 + x_2^2\}$

3. Determine se cada conjunto a seguir é ou não um subespaço de  $R^{2 \times 2}$ .

- (a) O conjunto de todas as matrizes diagonais  $2 \times 2$ .  
 (b) O conjunto de todas as matrizes triangulares inferiores  $2 \times 2$ .  
 (c) O conjunto de todas as matrizes  $A$   $2 \times 2$  tais que  $a_{12} = 1$ .  
 (d) O conjunto de todas as matrizes  $B$   $2 \times 2$  tais que  $b_{11} = 0$ .  
 (e) O conjunto de todas as matrizes simétricas  $2 \times 2$ .  
 (f) O conjunto de todas as matrizes singulares  $2 \times 2$ .

4. Determine o núcleo de cada uma das matrizes a seguir.

(a)  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$       (b)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -1 \\ -2 & -4 & 6 & 3 \end{pmatrix}$

(c)  $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$       (d)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & -5 \end{pmatrix}$

Exercício 4

5. Determine se cada conjunto a seguir é ou não um subespaço de  $P_4$ . (Cuidado!)

- (a) O conjunto dos polinômios em  $P_4$  de grau par.  
 (b) O conjunto dos polinômios de grau 3.  
 (c) O conjunto dos polinômios  $p(x)$  em  $P_4$  tais que  $p(0) = 0$ .  
 (d) O conjunto dos polinômios em  $P_4$  que têm pelo menos uma raiz real.

6. Determine se cada conjunto a seguir é ou não um subespaço de  $C[-1, 1]$ .

- (a) O conjunto das funções  $f$  em  $C[-1, 1]$  tais  $f(-1) = f(1)$ .  
 (b) O conjunto das funções ímpares em  $C[-1, 1]$ .  
 (c) O conjunto das funções não-decrescentes em  $[-1, 1]$ .  
 (d) O conjunto das funções  $f$  em  $C[-1, 1]$  tais  $f(-1) = 0$  e  $f(1) = 0$ .  
 (e) O conjunto das funções  $f$  em  $C[-1, 1]$  tais  $f(-1) = 0$  ou  $f(1) = 0$ .

7. Mostre que  $C^*[a, b]$  é um subespaço de  $C[a, b]$ .

8. Seja  $A$  um vetor particular em  $R^{2 \times 2}$ . Determine se cada conjunto a seguir é ou não um subespaço de  $R^{2 \times 2}$ .

(a)  $S_1 = \{B \in R^{2 \times 2} \mid AB = BA\}$

(b)  $S_2 = \{B \in R^{2 \times 2} \mid AB \neq BA\}$

(c)  $S_3 = \{B \in R^{2 \times 2} \mid BA = O\}$

9. Determine se cada conjunto a seguir é ou não um conjunto gerador para  $R^2$ .

(a)  $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

(b)  $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$

(c)  $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$

(d)  $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$

(e)  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

10. Quais dos conjuntos a seguir são conjuntos geradores para  $R^3$ ? Justifique suas respostas.

(a)  $\{(1, 0, 0)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 0, 1)^T\}$       (b)  $\{(1, 0, 0)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 0, 1)^T, (1, 2, 3)^T\}$

(c)  $\{(2, 1, -2)^T, (3, 2, -2)^T, (2, 2, 0)^T\}$       (d)  $\{(2, 1, -2)^T, (-2, -1, 2)^T, (4, 2, -4)^T\}$

(e)  $\{(1, 1, 3)^T, (0, 2, 1)^T\}$

11. Sejam

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -9 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(a)  $\mathbf{x} \in [\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}]?$

(b)  $\mathbf{y} \in [\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}]?$

Justifique suas respostas.

12. Quais dos conjuntos a seguir são conjuntos geradores para  $P_3$ ? Justifique suas respostas.

(a)  $\{1, x^2, x^2 - 2\}$       (b)  $\{2, x^2, x, 2x + 3\}$   
 (c)  $\{x + 2, x + 1, x^2 - 1\}$       (d)  $\{x + 2, x^2 - 1\}$

13. Em  $R^{2 \times 2}$ , sejam

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Mostre que  $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$  geram  $R^{2 \times 2}$ .

14. Seja  $S$  o espaço vetorial das seqüências infinitas definido no Exercício 15 da Seção 1. Seja  $S_0$  o conjunto das seqüências  $\{a_n\}$  tais que  $a_n \rightarrow 0$  quando  $n \rightarrow \infty$ . Mostre que  $S_0$  é um subespaço de  $S$ .

15. Prove que, se  $S$  é um subespaço de  $R^1$ , então  $S = \{\mathbf{0}\}$  ou  $S = R^1$ .

16. Seja  $A$  uma matriz  $n \times n$ . Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:

(a)  $N(A) = \{\mathbf{0}\}$ ;  
 (b)  $A$  é invertível;  
 (c) para cada  $\mathbf{b} \in R^n$ , o sistema  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tem uma única solução.

17. Sejam  $U$  e  $V$  subespaços de um espaço vetorial  $W$ . Prove que  $U \cap V$  também é um subespaço de  $W$ .

18. Seja  $S$  o subespaço de  $R^2$  gerado por  $\mathbf{e}_1$  e seja  $T$  o subespaço de  $R^2$  gerado por  $\mathbf{e}_2$ .  $S \cup T$  é um subespaço de  $R^2$ ? Explique.

19. Sejam  $U$  e  $V$  subespaços de um espaço vetorial  $W$ . Defina

$$U + V = \{\mathbf{z} \mid \mathbf{z} = \mathbf{u} + \mathbf{v} \text{ onde } \mathbf{u} \in U \text{ e } \mathbf{v} \in V\}$$

Mostre que  $U + V$  é um subespaço de  $W$ .

## 3 INDEPENDÊNCIA LINEAR

Nesta seção, vamos olhar mais de perto a estrutura de um espaço vetorial. Para começar, vamos nos restringir a espaços vetoriais que podem ser gerados por um número finito de elementos. Cada vetor no espaço pode ser construído a partir dos elementos nesse conjunto gerador, usando-se apenas as operações de soma e multiplicação por um escalar. É desejável encontrar um conjunto gerador “mínimo”. Por mínimo, queremos dizer um conjunto gerador sem elementos desnecessários (isto é, todos os elementos no conjunto são necessários para se gerar o espaço vetorial). Para ver como encontrar um conjunto gerador mínimo, é preciso considerar como os vetores no conjunto “dependem” um do outro. Vamos, então, introduzir os conceitos de *dependência linear* e *independência linear*. Esses conceitos simples vão nos dar a chave para entender a estrutura de espaços vetoriais.

Vamos considerar os seguintes vetores em  $R^3$ :

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Seja  $S$  o subespaço de  $R^3$  gerado por  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ . Observe que  $S$  pode ser representado, de fato, pelos vetores  $\mathbf{x}_1$  e  $\mathbf{x}_2$ , já que  $\mathbf{x}_3$  pertence ao espaço gerado por  $\mathbf{x}_1$  e  $\mathbf{x}_2$ .

$$(1) \quad \mathbf{x}_3 = 3\mathbf{x}_1 + 2\mathbf{x}_2$$

Qualquer combinação linear de  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$  pode ser reduzida a uma combinação linear de  $\mathbf{x}_1$  e  $\mathbf{x}_2$ :

$$\begin{aligned} \alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2 + \alpha_3\mathbf{x}_3 &= \alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2 + \alpha_3(3\mathbf{x}_1 + 2\mathbf{x}_2) \\ &= (\alpha_1 + 3\alpha_3)\mathbf{x}_1 + (\alpha_2 + 2\alpha_3)\mathbf{x}_2 \end{aligned}$$