

CE225 - Modelos Lineares Generalizados

Cesar Augusto Taconeli

30 de agosto, 2017

Aula 7 - Inferência em modelos lineares generalizados

Testes de hipóteses

- Vamos discutir neste momento testes para hipóteses do tipo:

$$H_0 : \beta = \beta_0 \quad H_1 : \beta \neq \beta_0 \quad (1)$$

- Nas hipóteses apresentadas, β representa um ou mais parâmetros do modelo ajustado, e β_0 valores postulados (fixados) para esses parâmetros na hipótese nula.

Testes de hipóteses

- Apenas para ilustração, considere o seguinte modelo:

$$\ln(\mu) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 \quad (2)$$

- Exemplos de hipóteses:

$$H_0 : \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{vs} \quad H_1 : \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ;$$

Testes de hipóteses

$$H_0 : \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{vs} \quad H_1 : \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_2 \neq 0;$$

$$H_0 : \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{vs} \quad H_1 : \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \dots$$

- Os principais testes de hipóteses em modelos lineares generalizados são:
 - Teste da razão de verossimilhanças;
 - Teste de Wald;
 - Teste escore.

Testes da razão de verossimilhanças

- Seja L_0 a verossimilhança maximizada sob a hipótese nula, e L_1 a verossimilhança maximizada de forma não restrita (permitindo que H_0 ou H_1 seja verdade).
- A razão $\Lambda = L_0/L_1 \leq 1$, uma vez que L_0 resulta da maximização sobre um conjunto restrito de valores para β .

Testes da razão de verossimilhanças

- A estatística do teste da razão de verossimilhança é definida por:

$$-2\ln\Lambda = -2\ln(L_0/L_1) = -2(l_0 - l_1), \quad (3)$$

sendo l_0 e l_1 as log-verossimilhanças.

- Sob H_0 e ϕ conhecido, a estatística do teste tem distribuição assintótica ($n \rightarrow \infty$) χ^2 com q graus de liberdade, sendo q o número de parâmetros fixados em H_0 .

Nota: se o parâmetro de dispersão é desconhecido (sendo estimado), o teste da razão de verossimilhança tem melhor aproximação pela distribuição F.

Testes de Wald

- Seja $\beta = (\beta_0, \beta_1)$, com β_0 e β_1 compondo uma partição do vetor de parâmetros original β , com q e $p - q$ parâmetros, respectivamente.
- Para testar $H_0 : \beta_0 = \mathbf{0}$, a estatística do teste de Wald fica definida por

$$\hat{\beta}_0' \widehat{Var}^{-1}(\hat{\beta}_0) \hat{\beta}_0, \quad (4)$$

em que $\hat{\beta}_0$ é a estimativa de β_0 produzida pela maximização da verossimilhança irrestrita e $\widehat{Var}(\hat{\beta}_0)$ é o bloco da matriz de variâncias, correspondente aos elementos de $\hat{\beta}_0$. também baseada na verossimilhança irrestrita.

- A estatística de Wald, sob H_0 e considerando ϕ conhecido, também tem distribuição assintótica ($n \rightarrow \infty$) χ^2 com q graus de liberdade, sendo q o número de parâmetros fixados em H_0 .

Testes de Wald

- Para o teste de um único parâmetro, com hipótese nula $H_0 : \beta_k = \beta_0$, a estatística do teste de Wald fica dada por:

$$z = \frac{\hat{\beta}_k - \beta_0}{\sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_k)}} \quad (5)$$

tendo, sob H_0 , distribuição assintótica $N(0, 1)$ quando ϕ é conhecido.

- A estatística do teste escore é definido por:

$$\mathbf{S}'(\hat{\beta}_0) \widehat{Var}_0(\hat{\beta}) \mathbf{S}(\hat{\beta}_0), \quad (6)$$

em que $\mathbf{S}(\hat{\beta}_0)$ e $\widehat{Var}_0(\hat{\beta})$ são a função escore e a matriz de variâncias avaliadas **sob o modelo restrito** (sob H_0).

- O teste escore não requer o ajuste do modelo sob H_1 , sendo conveniente quando H_1 define modelos bem mais complexos do que H_0 .
- O teste escore sob H_0 também tem distribuição assintótica ($n \rightarrow \infty$) χ^2 com q graus de liberdade, sendo q o número de parâmetros fixados em H_0 .

Ilustração - Testes




Figura 1: Log-verossimilhança e informação usada nos três testes para a hipótese $H_0 : \beta = a_0$.

Intervalos de confiança

- Intervalos de confiança para qualquer dos três métodos podem ser obtidos invertendo as respectivas estatísticas de teste.
- Por exemplo, um intervalo de confiança 95% para um único parâmetro β_k , é definido pelo conjunto de valores β_0 tais que $H_0 : \beta_k = \beta_0$ não é rejeitada ao nível de significância de 5%.
- Um intervalo de confiança assintótico $100(1 - \alpha)\%$ para β_k , **baseado no teste de Wald**, tem limites:

$$IC(\beta_k; 1 - \alpha) = \hat{\beta}_k \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_k)}, \quad (7)$$

em que $z_{\alpha/2}$ é o quantil $\alpha/2$ da distribuição normal padrão.

Intervalos de confiança

- Pode-se obter um intervalo de confiança para β_k baseado na **verossimilhança perfilada**.
- Seja $H_0 : \beta_k = \beta_0$ e Ψ representando o conjunto dos demais parâmetros do modelo.
- Ao inverter o teste da razão de verossimilhanças, para determinar o conjunto de valores β_0 que compõem o intervalo de confiança, a estimativa de máxima verossimilhança de Ψ varia para os diferentes valores de β_0 .
- O intervalo de confiança baseado na verossimilhança perfilada de β_k é definido pelo conjunto de valores β_0 tais que:

$$-2[L(\beta_0, \hat{\Psi}(\beta_0)) - L(\hat{\beta}_k, \hat{\Psi})] < \chi_1^2(\alpha), \quad (8)$$

sendo $L(\beta_0, \hat{\Psi}(\beta_0))$ a verossimilhança maximizada para $\beta_k = \beta_0$ e $L(\hat{\beta}_k, \hat{\Psi})$ a verossimilhança maximizada de forma irrestrita.

Intervalos de confiança

- Além de intervalos de confiança para os parâmetros, é interessante também obter intervalos de confiança para $\mu_{\mathbf{x}} = E[y|\mathbf{x}]$, sendo $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_p)'$ um específico vetor de covariáveis.
- A estimativa pontual para $\mu_{\mathbf{x}}$ é dada por:

$$\hat{\mu}_{\mathbf{x}} = g^{-1}(\mathbf{x}'\hat{\beta}). \quad (9)$$

- Seja $\hat{\eta}_{\mathbf{x}} = \mathbf{x}'\hat{\beta}$. Como $\hat{\eta}_{\mathbf{x}}$ é uma combinação linear dos $\hat{\beta}'$ s, decorre que, assintoticamente:

$$\hat{\eta}_{\mathbf{x}} \sim Normal(\mathbf{x}'\beta, \mathbf{x}'Var(\hat{\beta})\mathbf{x}) \quad (10)$$

Intervalos de confiança

- Um intervalo de confiança assintótico $100(1 - \alpha)\%$ para $\eta_{\mathbf{x}} = \mathbf{x}'\boldsymbol{\beta}$ fica dado por:

$$IC(\eta_{\mathbf{x}}; 1 - \alpha) = \mathbf{x}'\hat{\boldsymbol{\beta}} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\mathbf{x}'\widehat{\text{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}})\mathbf{x}}. \quad (11)$$

- Dessa forma, um intervalo de confiança assintótico $100(1 - \alpha)\%$ para $\mu_{\mathbf{x}} = g^{-1}(\eta_{\mathbf{x}})$ fica dado por:

$$IC(\mu_{\mathbf{x}}; 1 - \alpha) = (g^{-1}(LI); g^{-1}(LS)), \quad (12)$$

se $g(\cdot)$ é uma função estritamente crescente, e:

$$IC(\mu_{\mathbf{x}}; 1 - \alpha) = (g^{-1}(LS); g^{-1}(LI)), \quad (13)$$

se $g(\cdot)$ é uma função estritamente decrescente, onde LI e LS denotam os limites de confiança inferior e superior para $\eta_{\mathbf{x}}$.